

Syphilis

Qu'est-ce que la syphilis?

La syphilis est une maladie transmissible sexuellement. Elle est causée par la bactérie *Treponema pallidum*.

Comment attrape-t-on la syphilis?

La syphilis s'attrape en ayant des relations sexuelles vaginales, anales ou orales avec une personne qui souffre d'une syphilis évolutive. La bactérie est transmise de personne à personne par contact direct avec une lésion syphilitique. Ces lésions sont le plus souvent sur les parties génitales, mais elles peuvent être sur les lèvres, dans la bouche ou partout ailleurs sur le corps.

Comme la bactérie peut traverser le placenta durant la grossesse, une femme qui a la syphilis peut transmettre la maladie à son bébé.

Quels sont les symptômes?

Beaucoup de personnes infectées par la bactérie de la syphilis n'ont pas de symptômes pendant des années. Toutefois, qu'il y ait des symptômes ou non, l'infection est présente dans le corps et y restera jusqu'à ce qu'elle soit traitée et que la personne infectée soit guérie. Si l'infection n'est pas traitée, elle peut causer des complications graves.

Une fois contractée, l'infection évolue par stades. Les symptômes, qui sont différents à chaque stade, sont :

- Une lésion indolore, ronde, plate et soulevée sur les côtés, comme un gros furoncle. Parce que la lésion est indolore et peut se trouver à un endroit que vous ne pouvez pas voir, vous pourriez ignorer que vous avez une lésion.
- Des éruptions cutanées n'importe où sur le corps, en particulier sur la paume des mains et la plante des pieds.
- Une inflammation des ganglions

Dans ses derniers stades, la syphilis peut affecter le cœur, le cerveau ou d'autres organes.

Les premiers symptômes apparaissent entre 10 et 90 jours après un contact avec une personne infectée. La moyenne est de 21 jours.

Quel est le traitement?

La syphilis se traite par injections de pénicilline ou par la prise d'autres antibiotiques prescrits par un médecin. Il est important de suivre le traitement jusqu'à la disparition de l'infection.

Si vous avez la syphilis, vous devez travailler avec le personnel des Services de la santé publique pour informer vos partenaires sexuels afin que ces derniers puissent se faire examiner et soigner s'il y a lieu.

Si je contracte la syphilis une fois, est-ce que je peux la contracter de nouveau?

Oui. Le fait d'avoir eu la syphilis une fois n'empêche pas une personne de contracter la maladie de nouveau. Même si vous avez été soigné et guéri, vous pouvez être infecté de nouveau.

Comment se protéger contre la syphilis?

La meilleure façon d'éviter de contracter la syphilis et d'autres infections transmissibles sexuellement est :

- de s'abstenir d'avoir des contacts sexuels, ou
- d'avoir des contacts sexuels avec seulement une personne qui, à votre connaissance, n'a des contacts sexuels qu'avec vous. Avant d'avoir des contacts sexuels, vous et votre partenaire devriez passer un test de dépistage et être sûrs que vous n'êtes pas infectés.

Pour réduire le risque d'attraper la syphilis :

- Limitez le nombre de vos partenaires sexuels.
- Adoptez des pratiques sexuelles protégées pour toutes vos activités sexuelles, y compris les relations sexuelles orales. Utilisez des condoms et des digues dentaires.
- Évitez tout contact sexuel si vous ou votre partenaire avez des ulcères dans la région génitale.
- Renseignez-vous sur la prévention et le contrôle des maladies transmissibles sexuellement.
- Parlez à votre médecin pour savoir si vous devriez passer un test de dépistage de la syphilis et d'autres infections transmissibles sexuellement.

Consultez votre médecin si vous présentez l'un ou l'autre des symptômes de la syphilis.